

Requisitos de Vacunación en Guarderías y Preescolares de Missouri en 2012

Los niños pequeños son más susceptibles de tener complicaciones serias asociadas con ciertas enfermedades y tienen diferentes requisitos de vacunación que los niños más grandes.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP, por sus siglas en inglés) concede un período de gracia de cuatro días (cuatro días o menos antes del intervalo o edad recomendada) para que quienes asisten a centros públicos, privados, guarderías parroquiales, preescolares o jardines infantiles puedan vacunarse hasta cuatro días antes de su fecha límite.

Las vacunas deben ser administradas de acuerdo al calendario actual de ACIP. El Calendario de Vacunación Recomendado para las Personas de 0-6 Años de ACIP está disponible en www.cdc.gov/vaccines/recs/schedules/child-schedule.htm.

***Tenga en cuenta que** - Aunque no es necesario para poder asistir a la guardería o centros preescolares, ACIP recomienda que todos los niños estén vacunados apropiadamente con la vacuna contra el rotavirus, la gripe y la hepatitis A.*

La siguiente tabla indica las vacunas requeridas para los niños matriculados o que asisten a guarderías y centros preescolares en Missouri. Esta tabla se usa momento de realizar el informe de vacunación de la guardería y **NO** es un calendario recomendado. Esta tabla sólo debería utilizarse para determinar si un niño cumple con las normas de guarderías y preescolares de Missouri.

VACUNAS REQUERIDAS PARA ASISTIR A LA GUARDERÍA Y EL PREESCOLAR	DOSIS REQUERIDAS EN EL MOMENTO QUE EL NIÑO TIENE			
	3 Meses	5 Meses	7 Meses	19 Meses o más
DTaP/DT	1	2	3	4+
IPV (poliomielitis)	1	2	2	3+
Hib*	1	1+	2+	3+
Hepatitis B	1+	2	2+	3+
PCV** (neumocócica)	1	2	3	4+
MMR				1
Varicela				1

(+: Si un niño ha sido vacunado siguiendo las recomendaciones del calendario de ACIP, podría recibir más dosis de las requeridas para las guarderías y preescolares.)

***Hib:** el número de dosis que un niño necesita para completar la serie depende de la edad en que el niño comience la serie.

Primera dosis a los

7-11 meses
12-14 meses
15-59 meses

Número de dosis necesarias

3 (4 semanas entre la dosis 1 y la dosis 2, con una dosis de refuerzo a los 12-15 meses)
2 (8 semanas entre la dosis 1 y la dosis 2)
1

****PCV:** el número de dosis que un niño necesita para completar la serie depende de la edad en que el niño comience la serie.

Primera dosis a los

7-11 meses
12-23 meses
24-59 meses

Número de dosis necesarias

3 (4 semanas entre la dosis 1 y la dosis 2, con una dosis de refuerzo a los 12-15 meses)
2 (8 semanas entre la dosis 1 y la dosis 2)
1

